

28. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 02.04.2024 14:23 - Zaključeno



Nasadi jablan začenjajo s cvetenjem, na stopnji rožnatega popka so le še na poznih legah ((57)-62 po lestvici BBCH). Hruške cvetijo (65-67 po lestvici BBCH).

Deževno vreme zvišuje možnost primarnih okužb z **jablanovim škrlupom**. Z nadaljnjim razvojem nasadov in nestanovitnim vremenom svetujemo preventivno pristopanje z dotikalno delujočimi sredstvi kot so: **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha; od rožnatih popkov dalje), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha; datum veljavnosti 28.05.2024),... Nov nanos fungicida je potreben, ko pade več kot 25-30 mm dežja na m². V razmerah z dolgo omočenostjo listne površine pridejo v poštev sredstva kot so: **CHORUS FORTE** (3,6 l/ha, oz. 2 l /10.000 m² tretirane listne površine), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **AVALON** (1,125 l/ha; datum veljavnosti: 30.04.2024), **PYRAMID** (0,375 l/višinski meter, oz. največ 1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **BATALION 450 SC** (0,7-1,0 l/ha), **FABAN** (1,2 l/ha), **ERUNE 40 SC** (1,125 l/ha), **LAITANE** (1,125 l/ha), **PRETIL** (1,125 l/ha). Ostali pripravki z delnim zdravilnim delovanjem so še: **REYONA** (1,3 l/10.000 m² tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; deluje tudi na jablanovo pepelovko), **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje/ha, oz. največ 3,3 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFOL** (3,5 l/ha), **MAMTA250 EC** (0,2 l/ha),... slednji skupini je potrebno dodati tudi enega od dotikalno delujočih pripravkov (izjema je Faban). V ekološki pridelavi lahko uporabite **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred jablanovim škrlupom, listnimi pegavostmi, jablanovo pepelovko in sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na škrlup ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Proti **jablanovi pepelasti plesni** dodajte tudi 3 do 5 kg(l)/ha **žveplovih sredstev**. Na občutljivih sortah ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) vam v trenutnih razmerah svetujemo **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REYONA** (do največ 2 l/ha;). Vsi navedeni delujejo tudi na jablanov škrlup.

Sadjarje hkrati obveščamo še o izdaji dovoljenja za nujne primere varstva rastlin za sredstvo **BANJO**, ki ga lahko v obdobju od 18.03. in 15.07.2024 v nasadih jablan in hrušk uporabite za zatiranje **črnih listnih pegavosti** (*Alternaria* spp.). Nanesete ga v odmerku 0,7 l/ha pri porabi vode 500-1000 l (minimalna poraba vode na ha je 500 l). S sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ trikrat v eni rastni dobi, v razmaku 14 dni. Sredstvo se lahko uporabi od razvojne faze rožnatih popkov do faze sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 57-73). Prvo tretiranje se lahko opravi v razvojni fazi rožnatih popkov (BBCH 57), naslednje pa po cvetenju. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. Uporabljati se sme le v ograjenih nasadih, kjer je nezaposlenim preprečen dostop v nasad. Robne vrste oziroma drevesa se sme tretirati le v smeri od ograje, pri polovičnem zaprtju šob. Uporaba ročne škropilnice ni dovoljena. Karenca za jablane in hruške je 60 dni.

Pred začetkom cvetenja svetujemo namestitve **belih lepljivih plošč** za spremljanje **jabolčne grizlice**. V primeru preseženega praga škodljivosti (30 osic na ploščo), boste ukrepali po zaključenem cvetenju.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 02.04.2024 14:23

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

