

## 23. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.6 - 05.04.2024 08:48 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: polno cvetenje: najmanj 50 % cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65) po BBCH skali.

### • JABLANOV ŠKRLUP

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili dva manjša izbruha askospor **jablanovega škrlupa**, vendar pogoji za okužbo z jablanovim škrlupom niso bili izpolnjeni. V primeru napovedanih obilnejših padavin lahko pričakujemo ponovne izbruhe askospor, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlupu** priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF**, uporaba zalog do 28.11.2024), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan 700WG** - od razvojne faze rožnatih popkov, **Delan PRO**, **Alcoban**). **Uporaba aktivne snovi ditanon v jabolkah in hruškah ne sme presegati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi.**

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov:

| ANILINOPIRIMIDINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IBE oz. SDHI FUNGICIDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Batalion 450 SC (0,7-1,0 L/ha)</li> <li>◦ Faban (1,2 L/ha)</li> <li>◦ Pyramid (1,125 L/ha)</li> <li>◦ Pyrus 400 SC (1 L/ha)</li> <li>◦ Chorus 50 WG (0,45 kg/ha)</li> <li>◦ Scala (1,125 L/ha)</li> <li>◦ Avalon (1,125 L/ha)</li> <li>◦ Laitane (1,125 L/ha)</li> <li>◦ Erune 40 SC (1,125 L/ha)</li> <li>◦ Pretil (1,125 L/ha)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Difcor 250 EC (0,2 L/ha)</li> <li>◦ Difol (3,5 L/ha)</li> <li>◦ Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha)</li> <li>◦ Mavita 250 EC (0,2 L/ha)</li> <li>◦ Revyona (največ 2 L/ha)</li> <li>◦ Score 250 EC (0,2 L/ha)</li> <li>◦ Sercadis (0,25 – 0,3 L/ha)</li> <li>◦ Sercadis plus (1,2 L/ha)</li> </ul> |

Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

V **ekološki pridelavi** je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

### • JABLANOVA PEPELOVKA

Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri **temperaturi nad 15°C** dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ◦ Cosan               | ◦ Pepelin      |
| ◦ Kumulus DF          | ◦ Sulfar       |
| ◦ Microthiol disperss | ◦ Thiovit jet  |
| ◦ Microthiol special  | ◦ Vindex 80 WG |

## • JABOLČNA GRIZLICA

Ulov jabolčne grizlice na kontroliranih lokacijah je v letošnjem letu sorazmerno velik in je že presegel prag škodljivosti, ki znaša 30 osic na posamezno belo ploščo. V primeru preseženega praga škodljivosti je mogoče uporabiti **Neemazal – T/S** (1,5 L/ha na meter višine krošnje, poraba vode 300 – 500 L/ha na meter višine krošnje). PO KONČANEM CVETENJU je mogoče uporabiti **Mospilan 20 SG** (0,04 % konc.). Oba naštetata pripravka zatirata tudi sadnega listnega duplinarja in listne uši.

## • RDEČA SADNA PRŠICA

Trenutno najdemo rdečo sadno pršico na jablani v stadiju ličink. V primeru, da boste pri pregledu listov našli na enem listu 3 – 4 ličinke ali več, pri naslednjem škropljenju priporočamo uporabo pripravka **Nissorun 10 WP** (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju NE sme preseči 1 kg/ha) ali **Kanemite SC** (0,625 L/ha na meter višine krošnje, največ 1 škropljenje na sezono) Priporočamo škropljenje v večernem ali nočnem času.

## • HRUŠEV OŽIG

Po modelu Maryblyt pogoji za okužbe s hruševem ožigom (cvetne okužbe) ob upoštevanju vremenske napovedi v naslednjih petih dneh ne bodo izpolnjeni.

Datum objave obvestila: 05.04.2024 08:48

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

