

36. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 05.04.2024 12:53 - Zaključeno



Breskova pepelovka

Na izpostavljenih legah so nasadi zgodnjih sort breskev in nektarin v fenofazi H po Baggoliniju oz. BBCH71 (rast plodnice; odpadanje plodičev po cvetenju). Sedaj lahko opravite preventivno zatiranje **breskove pepelovke**. Za zatiranje priporočamo uporabo sredstev na osnovi **žvepla**. V ravninskih nasadih, kjer so drevesa še v fenofazi BBCH69 (Konec cvetenja; vsi venčni listi odpadli) s škropljenjem še počakamo.

Registrirana sredstva za zatiranje breskove pepelovke na breskvah:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
AZUMO WG	7,5 kg/ha
BIOTIP SULFO 800 SC	6 l/ha
COSAN	5 – 7,5 kg/ha
*CURATIO - ŽVEPLENO APNENA BROZGA	6 l/ha na meter višine krošnje
FYTOSAVE	2 l/ha
KUMULUS DF	5 – 7,5 kg/ha
MAVITA 250 EC	0,03 % oz. 0,45 l/ha
MICROTHIOL DISPRESS	5 – 7,5 kg/ha
MICROTHIOL SPECIAL	5 – 7,5 kg/ha
PEPELIN	5 – 7,5 kg/ha
POL-SULPHUR 800 SC	6 l/ha
SCORE 250 EC	0,03 % oz. 0,45 l/ha
SERCADIS	0,15 l/ha
SULFAR	5 – 7,5 kg/ha
THIOVIT JET	5 – 7,5 kg/ha
VERTIPIN	5 l/ha
VINDEX 80 WG	5 – 7,5 kg/ha

* Za zatiranje breskove pepelovke in listne luknjičavosti koščičarjev na breskvah je bilo izdano dovoljenje za nujne primere za pripravek Curatio žvepleno apnena brozga. Sredstvo se uporablja od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 l na ha na meter višine krošnje. Sredstvo smejo uporabljati poklicni pridelovalci pečkatga in koščičastega sadja, aktinidije, oljk ter ameriških borovnic, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Listne uši

V nasadih breskev in nektarin spremljajte pojav **zelene** in **rjave breskove uši**. Škodljivce zatiramo po cvetenju breskev in nektarin, če je presežen prag škodljivosti.

Prag škodljivosti za posamezno vrsto listnih uši:

Siva breskova uš	3 % naseljenih brstov pred cvetenjem, oziroma 7 % napadenih poganjkov po cvetenju. Za nektarine je tudi po cvetenju prag škodljivosti 3 %
Zelena breskova uš	10% napadenih poganjkov
Črna breskova uš, Rjava breskova uš	7% napadenih poganjkov
Medena breskova uš	prisotnost

Za zatiranje listnih uši na breskvah in nektarinah so registrirani spodnji pripravki:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
ASSET FIVE	0,96 l/ha
AFINTO	0,14 kg/ha
MOSPILAN 20 SG	0,025 % - 0,04 %
NEEMAZAL-T/S	1,5 l/ha (na meter višine krošnje in porabi najmanj 500 L vode na ha na meter višine krošnje)
PIRIMOR 50 WG	0,075 % oz. 0,75 kg/ha
TEPPEKI	0,14 kg/ha

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Na spodnji povezavi lahko dostopate do škropilnega programa za varstvo koščičarjev za leto 2024:
https://www.kmetijskizavod-ng.si/panoge/varstvo_rastlin/2023012508094354/skropilni_program_za_koscicarje_v_letu_2024/

Datum objave obvestila: 05.04.2024 12:53
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: **Marko Devetak**
[Seznam registriranih FFS](#)