

31. VARSTVO VINSKE TRTE - 05.04.2024 16:32 - Zaključeno



Vinska trta nadaljuje z brstenjem. Razvoj je različen glede na izpostavljenost sončnemu obsevanju in sortiment. Zasledimo lahko brste še v stadiju volne in na zgornjih legah razvoj listov, z mladikami do dolžine 5 cm (05-13 po lestvici BBCH).

Kjer imajo trte že razvite mladike, je potrebno pred padavinami opraviti preventivno varstvo pred okužbami s **črno pegavostjo vinske trte**. Uporabite lahko: **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **POLYRAM DF** (3 kg/ha; datum veljavnosti 28.05.2024), kar ponovite čez 7 do 10 dni, ko bodo mladike velike že 10-12 cm. Od odpiranja brstov do tretjega razvitega lista je v odmerku 3 kg/ha možna tudi raba **pripravkov na osnovi bakra**: **CUPRABLAU Z 35 WG**, **CUPRABLAU Z 35 WG**; slednja sta sprejemljiva tudi v ekološki pridelavi.

Topli dnevi s temperaturami nad 15°C omogočajo uporabo žveplovih pripravkov: **THIOVT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL** / ali **DISPERSS**, **PEPELIN WG**, **SULFAR**, **VINDEX 80 WG**, **VERTIPIN**, ki v odmerku 3 do 8 kg(l)/ha zmanjšajo stopnjo napada **pršic trsne kodravosti (akarinoze)**, **trsne pršice (erinoze)**, učinkujejo na zmanjševanje okužb **črne pegavosti vinske trte** in delujejo proti **oidiji vinske trte**.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 05.04.2024 16:32

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

