



26. Varstvo jablan in hrušk - 12.04.2024 08:37 - Zaključeno



Fenološka faza

Na območju Celjske regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte dosegle fenološko fazo polnega cvetenja F2 (BBCH 65) in pri zgodaj cvetočih sortah (Carjevič, Idared) prehajajo v fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67). Hruške so v fenološki fazi intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67).

Jablanov škrlup in pepelasta plesen

Ekstremno visoke dnevne temperature zraka in suho vreme v prvi dekadi meseca aprila ni ustvarjalo pogojev za okužbe z jablanovim škrlupom. Vremenska napoved napoveduje nadaljevanje zelo toplega vremena do konca tedna in poslabšanje vremena s padavinami v prvi polovici naslednjega tedna. Nadaljujte s preventivnim pristopom in približajte škropljenja jablan in hrušk proti škrlupu napovednim padavinam. Uporabite kontaktne oz. površinske fungicide na osnovi a.s. ditianon kot so: **Delan Pro** (2,5 L/ha), **Alcoban** (0,75kg/ha) ali **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha).

V ekološki pridelavi se lahko uporabi pripravek **Curatio** – žvepleno apnena brozga, ki ima dovoljenje za nujne primere in ga smejo uporabiti samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

V zadnjem tednu na posameznih lokacijah zasledimo pojav jablanove pepelovke. V nasadih, ki so močno okuženi s pepelasto pesnijo svetujem tudi dodajanje pripravkov kot sta: **Sercadis** (0,25 L/ha) ali **Luna experience** (0,25 L/1m višine krošnje/ha do max. 0,75 L/ha). Sercadis se uporablja tudi za zmanjšanje okužb jablanovega in hruševega škrlupa (0,25 – 0,3 L/ha). Prav tako bi bila smiselna uporaba sicer registriranih pripravkov na osnovi strobilurinov kot so: **Stroby WG** (0,2 kg/ha) ali **Zato 50 WG** (0,15 kg/ha), ki pa se ne tržijo.

V nasadih, kjer opazate močnejši pojav **jablanove pepelovke** in vam ne bi uspelo opraviti škropljenja pred padavinami, lahko takoj po padavinah (24 ur) v **kombinaciji s kontaktnim fungicidom**, uporabite tudi pripravke: **Sercadis plus** (kombinacija a.s. difenkonazol in fluksapiroksad), ki deluje hkrati na obe bolezni.

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Sulfar** ali **Vertipin**. Uporaba pripravkov na osnovi močljivega žvepla je **učinkovita v toplem vremenu (temperature nad 15°C)**.

Jabolčna grizlica

Na opazovanih lokacijah so trenutno ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah maloštevilni in pod pragom škodljivosti (prag škodljivosti: 20 do 30 grizlic na posamezno ploščo). **Ob koncu cvetenja opravite pregled plodičev na prisotnost poškodb.** Prag škodljivosti je dosežen, ko je poškodovanih 3% plodičev. Poškodbe v obliki luknjic, ki jih z leglico izvrtajo osice v cvetne čaše preden odložijo jajčeca so vidne kot majhne temne pege. **Ko bo cvetenje jablan popolnoma zaključeno je v primeru preseganja pragov škodljivosti upravičeno opraviti škropljenje s pripravkom Neemazal T/S (1,5 L/ha na 1 m višine krošnje, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 4,5 L/ha) ali Mospilan 20 SG (0,04 %).** Pripravka delujeta tudi na listne uši ter sadnega listnega duplinarja.

Jabolčni zavijač

Ekstremno visoke temperature zraka za ta letni čas so pospešile tudi začetek razvoja jabolčnega zavijača. Na feromonskih vabah smo prvega metuljčka zabeležili 8. aprila. V kolikor ste se pri zatiranju jabolčnega zavijača odločili za metodo zbeganja–konfuzijo in do zdaj še niste je zdaj čas, da izobesite dispenzorje. Izberete lahko med naslednjimi dispenzorji: **RAK 3**, **ISOMATE C TT**, **Checkmate puffer CM** – **Pro** ali **Semios NET – Codling Moth**.

Datum objave obvestila: 12.04.2024 08:37

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Priprava: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

