



32. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH - 12.04.2024 10:55 - Zaključeno



Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena

Posevki ozimnih žit so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 30-32).

Zatiranje bolezni

V ječmenu na opazovanih lokacijah ne beležimo povečanega pojava **ječmenovega listnega ožiga** in **ječmenove mrežaste pegavosti**. Je pa na ti dve glivični bolezni potrebno biti pozoren, še posebno v obdobju padavin, kajti okužbe se lahko zelo hitro razširijo. Priporočamo vam, da redno pregledujete svoje posevke in izvedete spomladansko tretiranje rastlin proti omenjenima glivičnima boleznima, ko je presežen prag. Ta znaša za ječmenov listni ožig, ko je na listih razvitih 35 % posameznih peg, pri ječmenovi mrežasti pegavosti pa, če se na 10% rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Za prvo tretiranje priporočamo uporabo pripravka, ki zatira obe bolezni. Izbirate lahko med naslednjimi sredstvi: **ASCRA XPRO** (1,2 L/ha), **CACTAI** (0,65 L/ha), **CHAMANE** (1 L/ha), **CAYUNIS** (1 L/ha), **DELARO FORTE** (1,2 - 1,5 L/ha), **ELATUS ERA** (1,0 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **IMTREX XE** (2 L/ha), **INPUT** (1,25 L/ha), **LIBRAX** (1,33 – 2,0 L/ha), **MIZONA** (1,0 L/ha; zaloge v prodaji do 31.7.2025), **NORIOS** (1 L/ha), **PECARI 300 EC** (0,65 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **PROSARO** (1,0 L/ha), **PROTENDO 300 EC** (0,65 L/ha), **RETENGO** (1,25 L/ha; zaloge v prodaji do 31.7.2025), **REVCARE** (1,5 L/ha), **REVYTREX** (1,125 L/ha), **SILTRA XPRO** (1,0 L/ha), **TAZER 250 SC** (0,8 L/ha), **VERBEN** (1 L/ha), **ZANTARA** (1,5 L/ha) ali **ZOXIS 250 SC** (1 L/ha).

Hkrati bi vas želeli opozoriti še na pojav **ramularijske pegavosti**. Bolezen je se je v zadnjih letih močno razširila tudi v Sloveniji. Povzroča sušenje listja, stebela in resic ozimnega in jarega ječmena. Škoda, ki jo povzroča, dosega že več kot 25 % zmanjšanje količine, močno pa je zmanjšana tudi kakovost pridelka. Na listih, še posebej na zastavičarju in listu pod njim, opazimo majhne temno rjave do črne pege. Vir za širjenje bolezni je predvsem okuženo seme, pa tudi okužene divje trave in druge vrste žit. Primeren čas za uporabo fitofarmacevtskih sredstev je v obdobju od razvojne stopnje BBCH 39 (popolnoma razvit vrhni list – zastavičar) pa do stopnje BBCH 51 (začetek klasenja, ko so vidne konice res). O pravočasni rabi in primernih FFS vas bomo opozorili v novem obvestilu.

Na pšenici je prag za **listno pegavost** presežen, če najdemo pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin. Prvo škropljenje lahko opravite z enim od naslednjih pripravkov: **ASCRA XPRO** (1,5 L/ha), **BOUNTY** (0,6 L/ha), **BRIVELA** (1,5 L/ha), **BUZZ ULTRA DF** (0,33 kg/ha), **CARAMBA** (1,5 L/ha), **CAYUNIS** (1 L/ha), **CHAMANE** (1 L/ha), **DELARO FORTE** (1,2 - 1,5 L/ha), **DUETT TURBO** (1 L/ha), **ELATUS ERA** (1 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **EMINENT 125 EW** (1 L/ha), **EMPARTIS** (1,5 L/ha), **IMTREX XE** (2 L/ha), **INPUT** (1,25 L/ha), **LIBRAX** (1,33-2,0 L/ha), **MIRADOR FORTE** (1,5 – 2 L/ha), **MIZONA** (1,0 L/ha, zaloge v prodaji do 31.7.2025), **ORIUS 25 EW** (1 L/ha), **NORIOS** (1 L/ha), **PECARI 300 EC** (0,65 l/ha), **PLEXEO** (1,5 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **PROSARO** (1 L/ha), **PROTENDO 300 EC** (0,65 l/ha), **REVCARE** (1,5 l/ha), **REVYSTAR** (1,5 L/ha), **REVYSTAR XL** (1,5 L/ha), **SILTRA XPRO** (1 L/ha), **SIRENA** (1,5 l/ha), **TAZER 250 SC** (0,8 L/ha), **VERBEN** (1 l/ha) ali **ZANTARA** (1,5 L/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Dodaten informacije so na voljo tudi v priloženem video posnetku <https://www.youtube.com/watch?v=YjmezMMILCM>

Datum objave obvestila: 12.04.2024 10:55

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: Karmen Rodič

Seznam registriranih FFS

