



34. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 12.04.2024 14:30 - Zaključeno



Nasadi jabolnan cvetijo, oz. ga zaključujejo (65 - 69 po lestvici BBCH). Hruške so s cvetenjem večinoma že zaključile (69 - 70 po lestvici BBCH).

Svetujemo nadaljevanje preventivnega varstvo pred **jablanovim škrlupom**. Zaščitno fungicidno oblogo je potrebno obnoviti še pred naslednjimi padavinami. Priporočamo pripravke kot so: **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha; od rožnatih popkov dalje), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha) [pri čemer upoštevajte, da uporaba a.s. ditianon pri jablanah in hruškah v eni rastni dobi ne sme presegati skupne količine 2625 g/ha aktivne snovi], **POLYRAM DF** (2 kg/ha; datum veljavnosti 28.05.2024),... Nov nanos fungicida je potreben tudi, ko pade več kot 25-30 mm dežja na m². V razmerah z dolgo omočenostjo listne površine pridejo v poštev sredstva kot so: **CHORUS FORTE** (3,6 l/ha, oz. 2 l /10.000 m² tretirane listne površine), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **AVALON** (1,125 l/ha; datum veljavnosti: 30.04.2024), **PYRAMID** (0,375 l/višinski meter, oz. največ 1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **BATALION 450 SC** (0,7-1,0 l/ha), **FABAN** (1,2 l/ha), **ERUNE 40 SC** (1,125 l/ha), **LAITANE** (1,125 l/ha), **PRETIL** (1,125 l/ha). Ostali pripravki z delnim zdravilnim delovanjem so še: **REYONA** (1,3 l/10.000 m² tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; deluje tudi na jablanovo pepelovko), **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje/ha, oz. največ 3,3 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFOL** (3,5 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,2 l/ha),... slednji skupini je potrebno dodati tudi enega od dotikalno delujočih pripravkov (izjema je Faban). V ekološki pridelavi lahko uporabite **CURATIO – ŽVEPLENO APNENABROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred **jablanovim škrlupom**, **listnimi pegavostmi**, **jablanovo pepelovko** in **sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov**), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na **škrlup** ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Proti **jablanovi pepelasti plesni** dodajte tudi 3 do 5 kg(l)/ha **žveplovih sredstev**. Na občutljivih sortah ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) pa svetujemo **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **REYONA** (do največ 2 l/ha;). Vsi navedeni delujejo tudi na **jablanov škrlup**.

Spremljajte ulov **jabolčne grizlice** na rumene lepljive plošče in v primeru preseženega praga škodljivosti (20-30 osic na ploščo, oz. 3 % napadenih plodičev) po zaključenem cvetenju uporabite **MOSPILAN SG 20** (0,04 % konc., 4 g na 10 l vode). Sredstvo učinkuje tudi na **listne uši**, **sadnega listnega duplinarja** in **bolšice**. V poštev pride tudi **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje; 1. nanos pred cvetenjem, 2. nanos 10-14 dni kasneje, po zaključenem cvetenju), ki stransko deluje še na **krvavo uš**, **sadnega listnega duplinarja**, **jabolčno grizlico**, **bolšice**, **škržate** in je dovoljen za ekološko pridelavo. Njegova uporaba je smiselna zlasti v primeru napada **mokaste jablanove uši** (prag škodljivost 1-2 koloniji na 100 poganjkov).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 12.04.2024 14:30

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

