

## 41. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 12.04.2024 15:05 - Zaključeno



### Škrlup

Zaradi suhega vremena v zadnjem tednu ni bilo pogojev za okužbe s škrlupom. Ponovni izbruh askospor pričakujemo ob padavinah, ki so napovedane v začetku prihodnjega tedna. V tem času beležimo intenzivni prirast listne mase. Nov list zraste vsake tri dni, zato je potrebno fungicidno zaščito pogosteje obnavljati. Priporočamo, da nasade pred napovedanimi padavinami poškropite s pripravki na osnovi ditianona (Delan Pro, Alcoban) ali kombinacijo ditianona in sistemičnega fungicida.

| Sredstvo                   | Aktivna snov                  | Odmerek, konc.                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontaktne fungicidi</b> |                               |                                                                                                             |
| Delan pro                  | ditianon + kalijeve fosfonati | 2,5 L/ha                                                                                                    |
| Alcoba                     | ditianon                      | 0,75 kg/ha                                                                                                  |
| <b>Sistemski fungicidi</b> |                               |                                                                                                             |
| Difol                      | folpet + difenokonazol        | 3,5 L/ha                                                                                                    |
| Score 250 EC               | difenkonazol                  | 0,2 L/ha                                                                                                    |
| Difcor 250 EC              | difenkonazol                  | 0,2 L/ha                                                                                                    |
| Duaxo koncentrat           | difenkonazol                  | Max. 3,3 L/ha.                                                                                              |
| Sercadis                   | fluksapiroksad                | 0,25 - 0,3 L/ha                                                                                             |
| Sercadis plus              | difenkonazol + fluksapiroksad | 1,2 L/ha (oz. 0,7 L/10.000 m <sup>2</sup> listne površine).                                                 |
| Revyona                    | mefentriflukonazol            | 1,3 L/10.000 m <sup>2</sup> tretirane površine listne stene, pri čemer je največji dovoljeni odmerek 2 L/ha |

### Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V nasadih, kjer imate močne okužbe s pepelovko priporočamo uporabo naslednjih pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Strobby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Sercadis v odmerku 0,25 – 0,3 L/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol disperss, Thiovit jet,...) v odmerku 3 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

### Hruševa grizlica (*Hoplocampa brevis*) in jabolčna grizlica (*Hoplocampa testudinea*)

Po cvetenju je čas za zatiranje grizlic. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. V nasadi hrušk in jablan za zatiranje grizlic lahko po cvetenju uporabite pripravek Mospilan 20 SG v 0,04 % konc.. V nasadih jablan za ta namen lahko uporabite tudi pripravek Neemazal T/S v odmerku 1,5 L na meter višine krošnje; največji dovoljen odmerek je 4,5 L/ha.

**Pri uporabi čebelarjev nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 12.04.2024 15:05

Obvestilo prognošičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024