



37. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI - 17.04.2024 14:50 - Zaključeno



Pri tehnologiji pridelave koruze se nagibamo k zatiranju plevelov po vzniku koruze in plevelov. Najbolj optimalen čas za uporabo herbicidov je, ko ima koruza dva do štiri liste (BBCH 12 – 14). Kasneje priporočamo uporabo česal. Zaradi antirezistenčne strategije je priporočljivo s herbicidi "kolobariti", kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov (aktivnih snovi) več let zapored, temveč jih zamenjajte s pripravki oz. drugimi aktivnimi snovmi. Pred uporabo pa vam priporočamo tudi, da pregledate posevke in ugotovite najpogostejše zastopane plevelne vrste in temu prilagodite izbiro

pripravka.

Uporaba herbicidov

V razvojni fazi od dveh listov naprej lahko uporabite: **ALISEO PLUS** * (70 g/ha, od 2. do 6. lista), **BASAGRAN 480** * (1,5-2 L/ha, od 2 do 7 lista), **BANDERA** * (1 L/ha, od 2. do 8. listov), **BOTIGA** (1 L/ha, od 2 do 8 listov), **BONACA** (0,8 L/ha, od 2 do 6 listov), **ELTIMS** (0,8 L/ha, od 2 do 6 listov), **CALARIS PRO** * (2,3 L/ha), **CALLISTO 480 SC** (0,15-0,3 L/ha), **OSORNO 480** (1 L/ha; od 2 do 8 listov), **CAPRENO** (0,3 L/ha, od 2 do 6 listov), **CLAP** * (0,3 L/ha), **ELUMIS** * (1,5 L/ha, do 8 listov), **EQUIP** (2-2,5 L/ha, od 2 do 6 listov), **FOCUS ULTRA** (1-4 L/ha, od 2 do 8 listov), **GENKI** * (1 do 1,2 L/ha; od 2 do 8 listov), **DICASH** * (0,6 L/ha, od 2 do 8 listov), **HARMONY 50 S C** (22,5 g/ha, od 2 do 8 listov), **HECTOR FLEX** * (0,48 kg/ha ali v deljenem (split) odmerku 2 x 0,24 kg/ha), **KALIMBA** * (0,6 L/ha, od 2 do 8 listov), **KAMBA 480 SL** (0,6 L/ha; od 2 do 8 listov), **KELVIN MAX** (0,75 L/ha; od 2 do 8 lista), **KOBAN TX** * (4 L/ha), **LAUDIS** (1,15 - 2,25 L/ha), **LAUDIS WG 30** (0,25-0,5 kg/ha, od 2 do 8 listov), **LONTREL 72SG** (0,17 kg/ha; od 2 do 9 listov), **LUMAX** * (3 - 4 L/ha), **LUMAX H 537.5 SE** (3 - 4 L/ha), **MILAGRO EXTRA 6 OD** * (0,75 L/ha, od 2 do 8 listov), **MILAGRO PLUS** * (0,8 L/ha; od 2 do 8 listov), **MOTIVELL** * (1 L/ha, od 3 do 6 listov), **MOTIVELL EXTRA 6 OD** * (0,75 L/ha; od 2 do 8 listov), **MONSOON ACTIVE** (1-2 L/ha, od 2 do 6 listov), **MURAL** * (0,6 - 0,75 L/ha; od 2 do 5 listov), **ONYX** (1,5 L/ha), **OSORNO** (1,5 L/ha, od 2 do 8 listov), **PEAK 75 WG** (20-30 g/ha, od vznika do 7 lista), **PRIMERO** * (1 L/ha, od 2 do 8 listov), **RIM 25 WG** (60 g/ha, od 1 do 7 listov), **RIMURON** (50 g/ha), **RINCON** * (60 g/ha), **SAMSON 4 SC** * (1 L/ha, od 2 do 8 listov), **SAMSON EXTRA 6 OD** * (0,75 L/ha, od 2 do 8 listov), **SPANDIS** * (0,4 kg/ha; od 2 do 8 listov), **STARANE FORTE** (0,54 L/ha, od 2 do 6 listov), **STOMP AQUA** * (3,3 L/ha), **STRETCH** (1 L/ha; od 2 do 8 listov), **SUCCESSOR 600** * (2 L/ha), **TALISMAN** (1,125 L/ha; od 2 do 8 listov), **TAROT 25 WG** * (50-60 g/ha, od 2 do 8 listov) ali **TEMSA SC** (1,5 L/ha, od 2 do 8 listov).

V razvojni fazi od treh listov naprej (glejte opombe pri vsakem pripravku) pridejo v poštev naslednji pripravki: **BANVEL 480 S** (0,6 L/ha, od 3 - 6 listov), **CALLAM** (300 g/ha; od 3 do 6 listov), **ENTAIL** * (170 ml/ha, od 3 do 5 listov), **HERBOCID XL** (1,25 L/ha; od 3 do 4 liste), **MILAGRO 240 SC** * (170 ml/ha; od 3 do 5 listov) in **NICOSH** * (1 L/ha, od 3 do 6 listov).

Na voljo je pa tudi nekaj pripravkov za pozno uporabo, ko ima koruza več kot 4 liste, in je v posevku potrebna korekcija (predhodni pripravek ni dobro počistil njive). Ti pripravki so: **BENI** * (1 kg/ha), **ESTERON** (1 L/ha, od 4 do 5 listov), **KELVIN OD** * (1 L/ha, od 4 do 7 listov), **RINIDI WG** * (440 g/ha, od 4 do 8 listov), **MUSTANG 306 SE** (0,5-0,6 L/ha, od 4 do 5 listov) in **VICTUS OD** * (1 L/ha, od 4 do 7 listov).

Pri uporabi herbicidov v spomladanskem času bodite še posebej pozorni na vremenske pogoje in sicer upoštevajte dnevne in nočne temperature zraka. V času aplikacije naj bodo dnevne temperature vsaj med 8 – 10 °C, nočne pa nad lediščem.

Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov. Pripravke, ki so označeni z * ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO!). Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

Ena od zahtev za izvajanje operacij Vodni viri (VOD), Ohranjanje kolobarja – stopnja III (KOL_3) in Varovalni pasovi ob vodotokih (PAS_VOD) intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP_NV) iz Strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo je tudi prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki jih na najožjih vodovarstvenih območjih ni dovoljeno uporabljati. Na seznam teh prepovedanih FFS sodijo tudi FFS, ki vključujejo aktivno snov nikosulfuron. Ker je stališče stroke, da nikosulfuron ne predstavlja tveganja za spiranje v podzemno vodo, če letna količina te aktivne snovi ne presega vrednosti 40 g aktivne snovi na hektar tretirane površine, se pri operacijah VOD, KOL_3 in PAS_VOD dovoli uporaba FFS z omenjeno vrednostjo aktivne snovi nikosulfuron. Izjema ne velja za najožja vodovarstvena območja, kjer prepoved uporabe aktivne snovi nikosulfuron še vedno ostaja. Ti pripravki so označeni z *.

Datum objave obvestila: 17.04.2024 14:50

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: Karmen Rodič

Seznam registriranih FFS



