



28. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 18.04.2024 21:58 - Zaključeno



Fenološka faza

Na območju Celjske regije so jabolane v povprečju na opazovane lokacije in sorte dosegle fenološko fazo (intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67) in prehajajo v fazo konca cvetenja H (BBCH 69). Hruška je povprečno na opazovano lokacijo zaključila cvetenje in prehaja v fazo razvoja plodičev.

Jablanov škrlup in pepelasta plesen

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 16. in 18. aprilom padlo med 22 in 28 mm padavin, delno tudi v obliki snežnih padavin. Ob padavinah smo zabeležili močan izbruh askospor in kljub nizkim temperaturam so bili na posameznih lokacijah izpolnjeni pogoji za zmerno okužbo z jablanovim škrlupom.

V kolikor vam vremenske razmere dopuščajo, nadaljujte s preventivnim pristopom škropljenja jablan in hrušk in ga približajte naslednjimi padavinam. Uporabite fungicide na osnovi a.s. ditianon kot so: **Delan Pro** (2,5 L/ha), **Alcoban** (0,75kg/ha) ali **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha).

V obdobju nestanovitnega vremena lahko uporabite tudi pripravek **Difol** (3,5 L/ha), ki vsebuje aktivni snovi difenokonazol in folpet. Sredstvo se uporablja predvsem preventivno, ima pa izraženo tudi kratko kurativno delovanje (KARENCA 110 dni !).

V primeru, da bi od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) dnevi in bi bilo listje skupaj mokro več kot dva dni ter bi padlo več kot 20 mm dežja in bodo temperature zraka nad 10 °C, svetujemo uporabo sistemskih IBE pripravkov na osnovi a.s. difenkonazol : **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Difenzone** (0,2 L/ha- od BBCH 71) ali tetrakonazol: **Domark 100 EC** (0,4 l/ha - od BBCH 69) ali **mefentriflukonazol: Revyona**(1,3 L/10.000 m2 tretirane površine listne stene, pri čemer je največji dovoljeni odmerek 2 L/ha) v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi.

V ekološki pridelavi se lahko uporabi pripravek **Curatio** – žvepleno apnena brozga, ki ima dovoljenje za nujne primere in ga smejo uporabiti samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

V nasadih, ki so močno okuženi s pepelasto pesnijo svetujem tudi dodajanje pripravkov kot sta: **Sercadis** (0,25 L/ha) ali **Luna experience** (0,25 L/1m višine krošnje/ha do max. 0,75 L/ha). Sercadis se uporablja tudi za zmanjšanje okužb jablanovega in hruševega škrlupa (0,25 – 0,3 L/ha). Prav tako bi bila smiselna uporaba sicer registriranih pripravkov na osnovi strobilurinov kot so: **Stroby WG** (0,2 kg/ha) ali **Zato 50 WG** (0,15 kg/ha), ki pa se ne tržijo.

V nasadih, kjer opazate močnejši pojav **jablanove pepelovke** in vam ne bi uspelo opraviti škropljenja pred padavinami, lahko takoj po padavinah (24 ur) **v kombinaciji s kontaktnim fungicidom**, uporabite tudi pripravek: **Sercadis plus** (kombinacija a.s. difenkonazol in fluksapiroksad), ki deluje hkrati na obe bolezni.

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Sulfar** ali **Vertipin**. Uporaba pripravkov na osnovi močljivega žvepla je **učinkovita v toplem vremenu (temperature nad 15°C)**.

Jabolčna grizlica

Na opazovanih lokacijah so ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah maloštevilni in pod pragom škodljivosti (prag škodljivosti: 20 do 30 grizlic na posamezno ploščo). **Ob koncu cvetenja opravite pregled plodičev na prisotnost poškodb**. Prag škodljivosti je dosežen, ko je poškodovanih 3% plodičev. Poškodbe v obliki luknjic, ki jih z leglico izvrtajo osice v cvetne čaše preden odložijo jajčeca so vidne kot majhne temne pege. **Ko bo cvetenje jablan popolnoma zaključeno je v primeru preseganja pragov škodljivosti upravičeno opraviti škropljenje s pripravkom Neemazal T/S** (1,5 L/ha na 1 m višine krošnje, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 4,5 L/ha) ali **Mospilan 20 SG** (0,04 %). Pripravka delujeta tudi na listne uši ter sadnega listnega duplinarja.

Datum objave obvestila: 18.04.2024 21:58

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

