



39. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 19.04.2024 08:47 - Zaključeno



Nasadi jabolnan in hrušk so cvetenje zaključili in oblikujejo plodiče (70 – 71 po lestvici BBCH).

Pri varstvu pred **jablanovim škrlupom** v razmerah z dolgotrajnejšo omočenostjo listja ter nižjimi temperaturami ozračja svetujemo kombinacijo pripravka **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha) ali **DELAN PRO** (2,5 l/ha) [pri čemer upoštevajte, da uporaba a.s. ditianon pri jablanah in hruškah v eni rastni dobi ne sme presegati skupne količine 2625 g/ha aktivne snovi] s sredstvi kot so: **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **BATALION 450 SC** (0,7-1,0 l/ha), **ERUNE 40 SC** (1,125 l/ha), **LAITANE** (1,125 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **PYRAMID** (0,375 l/višinski meter, oz. največ 1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **PRETIL** (1,125 l/ha), **SCALA** (1,125 l/ha). Pripravka **FABAN** (1,2 l/ha) in **CHORUS FORTE** (3,6 l/ha, oz. 2 l/10.000 m² tretirane listne površine) lahko nanese samostojno, brez dodatnega kombiniranja. V primeru, če takoj po obilnejših padavinah ne uspe opraviti ponovnega tretiranja, je potrebno enega od prvih treh naštetih pripravkov kombinirati s sredstvi, ki imajo tudi določeno zdravilno delovanje: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **REYONA** (1,3 l/10.000 m² tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; deluje tudi na jablanovo pepelovko), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje/ha, oz. največ 3,3 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFOL** (3,5 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,2 l/ha). V ekološki pridelavi lahko uporabite **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred *jablanovim škrlupom*, *listnimi pegavostmi*, *jablanovo pepelovko* in *sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov*), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na *škrlup* ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrogen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi). Nanos fungicida je potrebno obnoviti, ko pade več kot 25-30 mm dežja na m².

Proti *jablanovi pepelasti plesni* dodajte 3 do 5 kg(l)/ha **žveplovih sredstev**. Na občutljivih sortah ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) pa svetujemo **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **REYONA** (do največ 2 l/ha;). Vsi navedeni delujejo tudi na *jablanov škrlup*.

Nevarnosti cvetnih okužb jablan in hrušk s *hruševim ožigom* v letošnjem letu ni bilo. Potrebna pa je pozornost pri drugih sadnih in okrasnih gostiteljskih rastlin bakterije *Erwinia amylovora*, ki cvetijo v trenutnem deževnem obdobju: kutina, nešplja, fotinja. V primeru suma na okužbo, obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali najbližjo Službo za varstvo rastlin (<http://agromet.mkgp.gov.si/pp/>).

Z zaključenim cvetenjem iz nasada pospravite **bele lepljive plošče** za spremljanje naleta *jabolčne grizlice*. Prag škodljivosti je dosežen, ko se ulovi 30 ali več osic na ploščo (oz. 3 % napadenih plodičev). Takrat je potrebno uporabiti **MOSPILAN SG 20** (0,04 % konc., 4 g na 10 l vode), ki je predviden tudi proti prereznožitvam *listnih uši*, *sadnega listnega duplinarja* in *bolšic*. V poštevek pride še **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje; 1. nanos pred cvetenjem, 2. nanos 10-14 dni kasneje, po zaključenem cvetenju), ki stransko deluje tudi na *krvavo uš*, *sadnega listnega duplinarja*, *jabolčno grizlico*, *bolšice*, *škržate* in je dovoljen za ekološko pridelavo. Njegova uporaba je smiselna zlasti v primeru napada *mokaste jablanove uši* (prag škodljivost 1-2 koloniji na 100 poganjkov).

Ulov metuljev *jabolčnega zavijača* beležimo v feromonskih pasteh od zadnje dekade meseca marca. Dosedanje okoljske razmere niso bile ugodne za razvoj gosenic in nastanek poškodb. O ustreznem terminu varstva pred njim boste obveščeni.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrast.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 19.04.2024 08:47

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: Domen Bajec

Seznam registriranih FFS

