



38. Varstvo pečkarjev - 19.04.2024 15:23 - Zaključeno



Jablane v večini nasadov postopoma zaključujejo s cvetenjem ali pa so že odcvetele. Hruške so v fenološki fazi razvoja plodičev.

Kljub ohlادitvi je možnost okužb z jablanovim škrlupom še vedno velika. V primeru, da je od prejšnjega škropljenja padlo skupaj več kot 25 mm dežja, je fungicidna sprana, nezavarovano pa je tudi novo priraslo tkivo. Za preprečevanje okužb je ključno nadaljevanje preventivnega varstva z uporabo kontaktnih pripravkov tik pred naslednjimi padavinami. Svetujemo uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi ditianona: **Alcoban** (uporaba največ 3x v rastni sezoni), **Delan Pro** ali **Delan 700**

WG. S slednjima se lahko tretira največ 6x v eni rastni sezoni.

Uporaba aktivne snovi ditianon na jablanah in hruškah ne sme presežati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi.

Sistemični fungicidi iz skupine anilinopirimidinov so učinkoviti že pri temperaturah nižjih od 10 °C, vendar je njihova uporaba upravičena le izjemoma, v daljših deževnih obdobjih. Na voljo so pripravki **Chorus 50 WG**, **Chorus Forte** (na občutljivih sortah jablan in hrušk se lahko po tretiranju pojavijo znaki rjavosti na plodovih, pri občutljivih sortah hrušk se lahko pri nizkih jutranjih in visokih dnevnih temperaturah pojavijo nekrotične pege na listju), **Avalon**, **Batalion 450 SC** (do konca cvetenja), **Erune 40 SC**, **Laitane**, **Faban**, **Mythos**, **Pretil**, **Pyramid** (do velikosti plodičev 10 mm), **Pyrus 400 SC** (do konca cvetenja) in **Scala**. Vsem sistemskim fungicidom, razen sredstvu **Faban** in **Chorus Forte**, je potrebno dodati enega izmed prej naštetih dotikalnih pripravkov na osnovi a.s. ditianon.

S sredstvi iz skupine anilinopirimidinov so zaradi preprečevanja razvoja rezistence jablanovega škrlupa dovoljena največ 4 tretiranja v rastni sezoni!

Zaradi relativno nizkih temperatur razmere za okužbe z jablanovo pepelovko niso tako ugodne, kljub temu pa v nasadih, ki so močno okuženi, priporočamo uporabo sistemskih pripravkov kot so **Sercadis Plus**, **Sercadis** ali **Revyona**. Ti pripravki delujejo tudi proti jablanovemu škrlupu, proti kateremu se jih uporablja le izjemoma po daljšem deževnem obdobju, ko je listje omočeno 2 dni in ni bilo opravljenega preventivnega škropljenja pred padavinami. Proti jablanovi pepelovki ima sistemsko delovanje tudi pripravek **Luna experience**. Uporaba žeplovih pripravkov bo ponovno aktualna ob prvi otoplitvi (temperature nad 15°C). Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada!

V ekološki pridelavi za varstvo pred jablanovim škrlupom in pepelovko uporabite pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**. Stransko delovanje na jablanov škrlup ima tudi sredstvo **Karbicure**.

Prag škodljivosti jabolčne in hruševe grizlice je presežen v kolikor se je do zaključka cvetenja na eno **belo lepljivo ploščo** ujelo preko 30 grizlic. V tem primeru je potrebno z insekticidi ukrepati, ko bodo drevesa popolnoma odcvetela. Uporabite lahko pripravek **Mospilan 20 SG** ali **Neemazal –T/S**, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Obe sredstvi imata delovanje tudi na druge sesajoče in grizoče organizme.

Če še niste izobesite feromonske dispenzorje za **metodo zbeganja ali konfuzije** proti jabolčnemu zavijaču, ter feromonske pasti za spremljanje populacije jabolčnega zavijača v nasadih s klasičnim varstvom. Kljub temu, da smo pred ohlادitvijo že zabeležili ulove metuljev na feromonske pasti, trenutne razmere niso ugodne za razvoj gosenic in nastanek poškodb.

Na terenu opazamo prisotnost malega zimskega pedica, v cvetnih šopih, ki že povzroča škodo. Pridelovalci preglejte nasade in ukrepajte z enim izmed insekticidnih pripravkov, ki dosežejo ustrezno učinkovitost predvsem na zgodnjih stadijih gosenic. Priporočamo uporabo biotičnih pripravkov kot sta **Agree WG** in **Delfin WG**.

Zaradi varstva čebel in drugih opraševalcev, je potrebno pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev preberite navodila za uporabo in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

Priprava: Vesna Kocjan in Primož Žigon

Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 19.04.2024 15:23

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Kocjan Vesna

Priprava: **Vesna Kocjan**

Seznam registriranih FFS

