

42. Varstvo solate pred solatno plesnijo - 25.04.2024 11:50 - Zaključeno



□ Pridelovalce solatnic obveščamo, da se lahko zaradi hladnega in vlažnega vremena v posevkih solate pojavlja solatna plesen. Bolezen prepoznamo po belkasti plesnivi prevleki, ki se nahaja na spodnji strani listov. Na prostem in v zavarovanih prostorih lahko za zatiranje bolezni uporabite sredstva kot so **Amylo-X**, **Mirador 250 SC**, **Orondis Ultra**, **Ortiva**, **Revus**, **Taegro**, **Zaftra AZT 250 SC** in **Zoxis 250 SC**. Na prostem imajo za zatiranje solatne plesni dovoljenje fungicidi **Enervin** in **Polyram DF** (oba uporabno dovoljenje do 28.5.2024), **Infinito** ter **Cuprablau Z 35 WG**. Pri uporabi slednjega bodite pozorni, saj lahko deluje fitotoksično v primeru deževnega in hladnega vremena (temperature pod 8 °C). V zavarovanih prostorih lahko uporabite **Previcur Energy** po presajanju oz. najpozneje 21 dni pred spravilom pridelka.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 25.04.2024 11:50

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: MAROLT Neja

Priprava: **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

