



## 45. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 26.04.2024 21:51 - Zaključeno



Nasadi jablan in hrušk oblikujejo plodiče, ki presegajo premer 10 mm (71 po lestvici BBCH).

V nasadih so se med zadnjimi padavinami oblikovali pogoji za močno okužbo z **jablanovim škrlupom**. Svetujemo, da čim prej poskrbite za obnovo zaščitne fungicidne obloge. Pripravkom kot so **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha) ali **DELAN PRO** (2,5 l/ha) je potrebno dodati tudi sredstvo, ki ima zdravilno delovanje. Predlagamo **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **REYONA** (1,3 l/10.000 m<sup>2</sup> tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; deluje tudi na *jablanovo pepelovko*), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje/ha, oz. največ 3,3 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFOL** (3,5 l/ha) ali **MAMTA 250 EC** (0,2 l/ha). V kolikor vam je uspelo preventivno tretiranje opraviti že v prekinitev med zadnjimi deževnimi dnevi, lahko izbirate tudi med: **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **BATALION 450 SC** (0,7-1,0 l/ha), **ERUNE 40 SC** (1,125 l/ha), **LAITANE** (1,125 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **PYRAMID** (0,375 l/višinski meter, oz. največ 1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **PRETIL** (1,125 l/ha), **SCALA** (1,125 l/ha). Pripravka **FABAN** (1,2 l/ha) in **CHORUS FORTE** (3,6 l/ha, oz. 2 l/10.000 m<sup>2</sup> tretirane listne površine) lahko nanesete samostojno, brez dodatnega kombiniranja. V ekološki pridelavi uporabite **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred *jablanovim škrlupom*, *listnimi pegavostmi*, *jablanovo pepelovko* in *sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov*), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na *škrlup* ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrojen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Pomembno je, da poskrbite tudi za varstvo pred **jablanovo pepelasto plesnijo**. Pri občutljivih sortah ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) pridejo v poštev: **REYONA** (do največ 2 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m<sup>2</sup> listne površine), **SERCADIS** (0,25 l/ha), ki delujejo tudi na *jablanov škrlup*. Dodajanje **žveplavih sredstev** je smotno, ko se dnevne temperature gibljejo nad 15 °C.

Nanos fungicida je potrebno obnoviti, ko pade več kot 25-30 mm dežja na m<sup>2</sup>.

Ob otoplitvi bodite pozorni na začetek selitev kolonij **krvave uši** (prag škodljivosti je 5 – 8 % napadenih poganjkov) v višje predele dreves. Takrat je smiselno pristopiti s pripravkom **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha), ki hkrati deluje še na *ameriškega* in *vejicatega kaparja*, *bolšice* ter *listne hrčice*. Proti krvavi uši pride v poštev tudi **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

**Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.**

**Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 26.04.2024 21:51

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

