



81. VARSTVO VINSKE TRTE - 19.07.2018 09:30 - Zaključeno



Vinska trta na območju vinorodne dežele Posavje prehaja v začetek zorenja, s sortno značilnim barvanjem grozdnih jagod (81 po lestvici BBCH).

Redne in intenzivne padavine so za razvoj vinske trte precej neugodne. Številna neurja, tudi s točo, izpirajo zaščitno oblogo in predstavljajo idealne pogoje za razvoj glivičnih obolenj.

Okužbe s **peronosporo vinske trte** se najpogostejše na vrhovih in mlajših listih, a najdemo jih tudi na grozdju. *Kjer je prišlo do okužb na grozdju*, priporočamo oceno količine pridelka in ročno redčenje okuženih grozdčev. V letošnji rastni dobi je rodni nastavek sorazmerno obilen in ob taki priložnosti odstranimo okužene grozdne jagode. Prepoznate jih po temno modrih lisah, ki postopoma prekrijejo celotno površino, na kar se jagoda tudi zguba. Za zaščito s fitofarmaceutskimi sredstvi izbirajte med: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **ANTRACOL COMBI 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (2 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (3 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYAF** (2,5 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **CYMBAL** (0,25 kg/ha), ... V vinogradih, *kjer je rast prebujna*, lahko uporabite tudi **sredstva v kombinaciji z bakrom**: **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **CURZATE C EXTRA** (2 kg/ha), **PERGADO C** (4-5 kg/ha). *Kjer okužb s peronosporo ni zaznati*, lahko opravite redno zaščito tudi z **enostavnimi preventivnimi sredstvi**. V ekološki pridelavi pridejo v poštev **preparati na osnovi bakra**, pri čemer upoštevajte, da njihova uporaba umirja bujnost.

Zaščitno oblogo obnovite najkasneje na 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m² padavin ali več. V primeru, da okužb kljub periodičnemu varstvu ne morete obvladati, predlagamo dve zaporedni tretiranji na 3-4 dni, s katerim prekinete razvojni krog glive.

Na nekaterih legah še vedno prihaja tudi do okužb z **oidijem vinske trte**. Širjenje bolezni preprečite z uporabo pripravkov kot so: **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 – 0,3 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 - 1,25 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **CUSTODIA** (0,7 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **STAR TEBUKONAZOL** (0,4 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **KUSABI** (0,25 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), ... V ekološki pridelavi je poleg **preparatov na osnovi žvepla** primerna raba sredstev: **VITISAN** (12 kg/ha) in **AQ 10** (35 g/ha).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 19.07.2018 09:30

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

