



87. VARSTVO VINSKE TRTE - 24.07.2018 15:30 - Zaključeno



Vinska trta na območju vinorodne dežele Posavje prehaja v začetek zorenja, s sortno značilnim barvanjem grozdnih jagod (81 – 83 po lestvici BBCH).

Pogoste in intenzivne padavine omogočajo širjenje glivičnih obolenj in hkrati temeljito izpirajo zaščitno fungicidno oblogo. Dodatno težavo predstavljajo številna neurja s točo, ki fizično poškoduje grozde, da so dovzetnejši na razvoj gnilobe.

Prihodnjo zaščito pred **peronosporo vinske trte** načrtujte s preventivnimi, dotikalnimi sredstvi kot so: **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **PENNZOZEB 75 DG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (2 l/ha), **FOLLOW 80 WG** (1,25 kg/ha), **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYAF** (2,5 l/ha). Kjer je rast bujna, lahko uporabite tudi sredstva na osnovi bakra: **BADGE WG** (2, kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha), **CUPROXAT** (5,3 l/ha), **KOCIDE 2000** (2 kg/ha), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha), oz. v kombinaciji z bakrom: **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **PERGADO C** (4-5 kg/ha). Tovrstni pripravki so primerni tudi v situacijah varstva vinske trte po toči. Kjer so okužbe obsežnejše, jih čim prej zaustavite s kombiniranimi pripravki kot so: **ANTRACOL COMBI 62,8** (2,5 kg/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **CURZATE M72,5 WG** (2,3 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 k/ha),...

Okužbe z **oidijem vinske trte** še v naprej preprečujte s: **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 – 0,3 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 - 1,25 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **CUSTODIA** (0,7 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **STAR TEBUKONAZOL** (0,4 l/ha), **TEBUSH 25% EW** (0,4 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **KUSABI** (0,25 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIUS 25 EW** (0,4 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha),... V ekološki pridelavi je poleg pripravkov na osnovi žvepla primerna raba sredstev: **VITISAN** (12 kg/ha) in **AQ 10** (35 g/ha).

Na s hranili prezaloženih ali od toče poškodovanih vinogradniških površinah beležimo čedalje pogostejše pojave **sive plesni**. Kjer je mogoče, priporočamo ročno redčenje grozdov, sicer pridejo v poštev botriticidni pripravki: **MYTHOS** (2,5 l/ha), **CANTUS** (1,2 kg/ha), **PROLECTUS** (1,2 kg/ha), **PYRUS 400 SC** (2 l/ha), **SCALA** (2 l/ha), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (1,5 l/ha) ali **AMYLO – X** (2,5 l/ha; do 6 zaporednih nanosov v obdobju 7 – 10 dni), **BOTECTOR** (400 g/ha; do 4 zaporednih nanosov v obdobju 7 – 10 dni), oz. **SERENADE ASO** (8 l/ha; do 6 zaporednih nanosov v obdobju 7 – 10 dni). Slednji trije spadajo v skupino biotičnih sredstev in je njihova uporaba možna tudi v ekološki pridelavi.

Zaščitno oblogo obnovite najkasneje na 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m² padavin ali več

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 24.07.2018 15:30

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)