

23. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.04.2019 15:53 - Zaključeno



Vinska trta brsti. Zasledimo lahko odpiranje brstov, kjer so lahko opazni že posamezni prvi listki (05-11 po lestvici BBCH).

Deževni dnevi v času brstenja predstavljajo precejšnjo nevarnost za okužbo mladik s **črno pegavostjo vinske trte**. Svetujemo, da zaščitite vinograde s preventivno delujočimi pripravki kot so: **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (3 l/ha; zaloge v uporabi do 30.03.2020), **POLYRAM DF** (3 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha; zaloge v uporabi do 22.06.2019), **ANTRACOL** (2 kg/ha; zaloge v uporabi do 22.06.2019). Zaščitne ukrepe bo potrebno ponoviti po 7 do 10 dneh, ko bodo mladike velike 5-7 cm.

Dnevi s temperaturami nad 15°C omogočajo uporabo žveplovih pripravkov: **THIOVT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **VINDEX 80 WG**, ki v odmerku 3 do 8 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada **pršic trsne kodravosti (akarinoze)**, **trsne pršice (erinoze)**, učinkujejo na zmanjševanje okužb **črne pegavosti vinske trte** in delujejo proti **oidiju vinske trte**.

Časovni razmiki med obnovo nanosa je lahko od 8 do 10 dni.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 12.04.2019 15:53

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

