

34. VARSTVO VINSKE TRTE - 06.05.2019 15:10 - Zaključeno



Razvoj vinske trte je v povprečju na stopnji štirih do šestih razgrnjenih listov (14 - 16 po lestvici BBCH), v dolžini mladik med 7-10 cm.

Ob zaključevanju meseca aprila (25.-26.04.2019) so bili na zgodnejših legah izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s **peronosporo vinske trte**. Svetujemo, da vinograde v nestanovitnih vremenskih razmerah zaščitite pred naslednjim obdobjem intenzivnejših padavin s pripravki kot so: **FOLLOW 80 WG** (1,25 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (2 l/ha; zaloge v uporabi do 30.03.2020), **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha; zaloge v uporabi do 22.06.2019), **ANTRACOL** (2 kg/ha; zaloge v uporabi do 22.06.2019), **DITHANE DG Neotec** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **PENNZOZEB 75 DG** (2 kg/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5 kg/ha), **DELAN PRO** (3,0 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYAF** (2,5 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha). Možna je tudi uporaba sredstev na osnovi fosetil aluminija, pri katerih je potrebno nanos opraviti 3 × zaporedoma, v razmiku 8-10 dni (prilagodite intenzivnosti rasti): **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (1-2 kg/ha).

Z razvojem mladik in višanjem dnevnih temperatur narašča ob padavinah tudi možnost **poškodb od toče**. V tem primeru opravite varstvo čim prej, a počakajte, da se mladike osušijo. Prvi cilj je razkužitev in osušitev poškodovanega tkiva, s čimer patogenom otežimo vstop v rastlino. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo *folpet* (follow 80 wg, folpan 80 wdg, folpan 50 sc videryo f, vincya f, daimyo,...).

Proti **oidiji vinske trte** uporabite pripravek na osnovi žvepla: **THIOVT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **VINDEX 80 WG**; v odmerku 3 do 8 kg/ha. Slednji učinkujejo na zmanjševanje napada **pršic trsne kodravosti (akarinoze)**, **trsne pršice (erinoze)**. Na legah, kjer povzročata oidij redne in hude okužbe, lahko pristopite z **UNIVERSALIS** (2 l/ha; deluje na peronosporo in oidij), oz. **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha).

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 06.05.2019 15:10

Obvestilo prognozičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

