



## 46. VARSTVO VINSKE TRTE - 29.05.2019 23:53 - Zaključeno



V vinogradih je razrast v deževnih in nekoliko toplejših dneh dobila ponoven zagon. Mladike dosegajo dolžino 50 – 70 cm; Socvetja so nabrekla, cvetovi tesno stisnjeni skupaj (55 po lestvici BBCH).

Deževno vreme omogoča ugodne pogoje za okužbo s *peronosporo vinske trte*. Za varstvo svetujemo kombinirane pripravke kot so: **DELAN PRO** (3 l/ha) **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,25 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (1,25 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha). Sistemsko delujoča **SORIALE LX** in **LBG-01F34** nanese v odmerku 4 l/ha, če ju uporabite samostojno, oz. 3 l/ha v kombinaciji s fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb. S sredstvi na osnovi aktivne snovi foseetil aluminij je potrebno nanos opraviti 3 × zaporedoma, v razmiku 8-10 dni (prilagodite intenzivnosti rasti): **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (1-2 kg/ha).

**V primeru neurja s točo** opravite varstvo vinograda čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: FOLPAN 50 SC, FOLPAN 80 WDG, FOLLOW 80 WG ali katerim drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet.

Proti *oidiji vinske trte* dodajte pripravek na osnovi žvepla: **THIOVIT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG** ali **VINDEX 80 WG**; v odmerku 3 do 8 kg/ha. Slednji učinkujejo tudi na zmanjševanje napada *pršic trsne kodravosti (akarinoze)*, *trsne pršice (erinoze)*. Na legah, kjer povzročata oidij redne in hude okužbe, lahko pristopite s **SERCADIS** (0,15 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha),...

Razmike med tretiranjmi v tem obdobju prilagodite intenzivnosti padavin (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslABLJENA), oz. na 7 - 8 dni.

**V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 29.05.2019 23:53

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

