

**68. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 05.07.2019 10:13 - Zaključeno**

Pridelovalcem **češenj in višenj** priporočamo, da po zaključenem obiranju pridelka preprečite prezgodnje odpadanje listja zaradi **češnjeve listne pegavosti** in **listne luknjičavosti koščičarjev** ter poskrbite za nemoten nadaljnji razvoj drevja. Prezgodnja defoliacija vodi v stresne razmere in moteno preobrazbo cvetih brstov za naslednjo rastno dobo. Za varstvo pridejo v poštev pripravki: **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (2,25 kg/ha; največ 3× v rastni dobi), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha), **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha).

V nasadih **marelic ter breskev in nektarin** poskrbite za zaščito pridelka pred **sadnimi gnilobami**, ki jih omogočajo fizične poškodbe nastale v neurju ali ob napadih žuželk. Uporabite lahko: **AMYLO – X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,6 kg/ha), **PROLECTUS** (1,2 kg/ha), **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **SWTCH 62,5 WG** (1 kg/ha).

Za zatiranje *breskovega zavijača* v nasadih breskev uporabite: **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha), **AFFIRM** (3-4 kg/ha), **CORAGEN** (300 ml/ha), **LASER PLUS** (0,25 l/ha)...

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.**

Datum objave obvestila: 05.07.2019 10:13

Obvestilo prognošičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

