



73. OBVESTILO ZA VARSTVO BUČK - 10.07.2019 14:43 - Zaključeno



Na rastlinah bučk se je začela pojavljati *pepelovka bučnic*. Za njeno zatiranje lahko uporabite:

ORTIVA (1 l/ha; uporaba na bučnicah, karenca 3 dni),

TOPAS 100 EC (0,5 l/ha; uporaba na bučkah, dinjah in lubenicah v zaščitenih prostorih; karenca 3 dni),

TOPAZE (0,5 l/ha; uporaba na bučkah, dinjah in lubenicah v zaščitenih prostorih; karenca 3 dni),

COLLIS (0,5 kg/ha; uporaba v zaščitenih prostorih na bučnicah z užitno lupino, bučke in drugi hibridi z užitno lupino; karenca 3 dni),

DUAXO KONCENTRAT (10 ml/1l; kumare in bučke; karenca 3 dni),

AQ-10 (35 g/ha; karenca 24 ur),

VITISAN (1,5 - 3 kg/ha; na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice); karenca 1 dan),

SERENADE ASO (8 l/ha; na bučah, lubenicah in dinjah, karenca ni potrebna),

COSAN (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),

KUMULUS DF (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),

PEPELIN (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),

THIOVIT JETI (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),

VINDEX 80 WG (5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),

MICROTHOL SC (5 - 7,5 l/ha; na bučnicah z užitno (bučke, kumarice za vlaganje) in neužitno lupino (melone, lubenice, buče), karenca 3 dni),

MICROTHIOL SPECIAL (5 - 7,5 kg/ha uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni),

SCORE 250 EC (0,5 l/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni),

VELUM PRIME (0,625 l/ha; karenca na bučnicah, dinje, buče in lubenice 3 dni; za kumare in bučke 1 dan),

SYSTHANE 20 EW (0,15 l/ha; na bučkah, kumarah in kumaricah na prostem in v zaščitenih prostorih, karenca za bučke, kumare in kumarice je 3 dni; za buče je 7 dni),

MIRADOR 250 SC (1 l/ha na bučkah, karenca 3 dni),

ZAFIRA AZT 250 SC (1 l/ha na bučkah, karenca 3 dni),

TOPSIN – M (1 kg/ha na dinjah, karenca 3 dni),

BIOTIP SULFO 800 SC (5 - 7,5 l/ha na bučkah, bučah, kumarah in lubenicah, karenca 3 dni),

SCORE 250 EC (0,5 l/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni),

MAVITA 250 EC (0,5 l/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni),

VITISAN (1,5 - 3 kg/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice, karenca 1 dan),

SERCADIS PLUS (0,6 l/ha na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi) in neužitno lupino (dinje, orjaška buča, lubenice in drugi hibridi), karenca 3 dni).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 10.07.2019 14:43

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

Seznam registriranih FFS

