



75. VARSTVO VINSKE TRTE - 16.07.2019 16:40 - Zaključeno



V vinorodni deželi Posavje vinska trta še oblikuje grozdčice; večina jagod se med seboj dotika (79 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred *peronosporo vinske* trte svetujemo do začetka zorenja varstvo s pripravki kot so: **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (3 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (4 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **CYMBAL** (0,25 kg/ha),... Kjer je rast prebujna, lahko uporabite tudi sredstva v kombinaciji z bakrom: **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **CURZATE C EXTRA** (2 kg/ha), **PERGADO C** (4-5 kg/ha). V ekološki pridelavi pridejo v poštev **PRIPRAVKI NA OSNOVI BAKRA**, pri čemer upoštevajte, da njihova uporaba umirja bujnost. Kjer grozdne jagode nekoliko zaostajajo v razvoju, lahko v primeru obsežnejših okužb opravite nanos pripravka: **REBOOT** (0,4 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (2,5 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **FOLPAN GOLD** (staro ime **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE**; 2,5 kg/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), ali **SFINGA EXTRA WDG** (2 kg/ha),...

Proti oidiju vinske trte priporočamo Uporabo sredstev kot so: **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **CUSTODIA** (0,525 l/ha), **SPIROX D** (0,5 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,2 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 - 0,3 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha),... V ekološki pridelavi je poleg **prilavkov na osnovi žvepla** primerna raba sredstev: **VITISAN** (12 kg/ha) in **AQ 10** (35 g/ha).

V stresnih okoljskih razmerah (izredno visoka temperatura ozračja, suša, nizke temperature) se srečujemo s pogosto uporabo spodbujevalcev rasti in listnih gnojil. Vinogradnike opozarjamo, da nepoznavanju njihovega načina delovanja sledi pojav fitotoksičnosti. Svetujemo, da trtam nudite le sredstva, ki so nujna za vzdrževanje njihovega zdravstvenega stanja.

Upoštevajte, da visoke temperature ovirajo nanos in učinkovitost fitofarmaceutskih sredstev. Zaščito vinogradov opravite v večernem ali jutranjem času, ko so temperature nižje in se izognete zanašanju. Razmike med tretiranjimi prilagodite intenzivnosti priraščanja in morebitnim padavinam (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslABLJENA), oz. na 7 - 8 dni.

V primeru neurja s točo opravite varstvo vinograda čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, **FOLLOW 80 WG** ali katerim drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet.

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 16.07.2019 16:40

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)