



79. VARSTVO VINSKE TRTE - 24.07.2019 14:14 - Zaključeno



V vinorodni deželi Posavje se večina jagod v grozdu med seboj dotika in postopoma prehaja v zorenje (79 – 81 po lestvici BBCH).

Pri varstvu pred **peronosporo vinske** trte bodite za zadnja tretiranja pozorni na izbiro sredstev. Priporočamo predvsem dotikalne, saj v tem obdobju sistemično delujoči pripravki ne pridejo več do izraza. Okužbe mladih poganjkov in vršičkov se bodo vrstile vse do jeseni in ne predstavljajo posebne nevarnosti za dozorevanje pridelka. Pomembnejše je omejevanje okužb na grozdu, pri čemer bo potrebno tudi ročno redčenje. Med fungicidi izbirajte: **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha; do začetka zorenja [81 po BBCH]), **GETT** (2,5 kg/ha; do začetka zorenja), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha; do mehčanja jagod [85 po BBCH]), **ENERVIN** (2,5 kg/ha; do začetka zorenja grozda), **PERGADO F** (3 kg/ha; do začetka zorenja), **PERGADO D** (1,4 l/ha; do začetka zorenja), **ORVEGO** (0,8 l/ha; do barvanja jagod [83 po BBCH]), **DITHANE M-45** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **MILDICUT** (4 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha; do mehčanja jagod), **VINCYAF** (2,5 l/ha; do mehčanja jagod), **DAIMYO F** (2,5 l/ha; do mehčanja jagod),... Kjer je rast prebujna, lahko uporabite tudi sredstva v kombinaciji z bakrom: **PERGADO C** (4-5 kg/ha) do začetka zorenja, oz. **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha) do mehčanja jagod.

Proti **oidiji vinske trte** še naprej svetujemo: **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha; do začetka barvanja), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha; do začetka zorenja), **DYNALI** (0,65 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha; do začetka zorenja), **CUSTODIA** (0,7 l/ha; do začetka zorenja), **SERCADIS** (0,15 l/ha; do barvanja jagod), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha; do mehčanja jagod), **ORIUŠ 25 EW** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha; do začetka zorenja), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha; do začetka zorenja), **POSTALON 90 SC** (1,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 - 0,3 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha; do začetka zorenja), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha; do začetka zorenja),...

V primeru neurja s točo opravite varstvo vinograda čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: FOLPAN 50 SC, FOLPAN 80 WDG, FOLLOW 80 WG ali katerim drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet.

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 24.07.2019 14:14

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

