

82. VARSTVO VINSKE TRTE - 31.07.2019 11:47 - Zaključeno



V vinorodni deželi Posavje so vinogradi na stopnji začetka zorenja (81 – 83 po lestvici BBCH).

Pri varstvu pred *peronosporo vinske trte* potekajo zadnja tretiranja. Uporabite lahko: **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha; do začetka zorenja [81 po BBCH]), **GETT** (2,5 kg/ha; do začetka zorenja), **ENERMIN** (2,5 kg/ha; do začetka zorenja grozdja), **PERGADO D** (1,4 l/ha; do začetka zorenja), **PERGADO F** (3 kg/ha; do začetka zorenja), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha; do mehčanja jagod [85 po BBCH]), **ORVEGO** (0,8 l/ha; do barvanja jagod [83 po BBCH]), **DITHANE M-45** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **MILDICUT** (4 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha; do mehčanja jagod), **VINCYAF** (2,5 l/ha; do mehčanja jagod), **DAIMYO F** (2,5 l/ha; do mehčanja jagod),... Kjer je rast prebujna, lahko uporabite tudi sredstva v kombinaciji z bakrom: **PERGADO C** (4-5 kg/ha) do začetka zorenja ali **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha) do mehčanja jagod, oz. bakrove pripravke: **CUPROXAT** (5,3 l/ha; do začetka zorenja), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha; do začetka zorenja jagod), **BADGE WG** (2,5 kg/ha; do obarvanja jagod), **KOCIDE 2000** (2 kg/ha; do trgatve [85 po lestvici BBCH]), **CUPRABLAU Z 35 WG** (3 kg/ha; 21 dni karence), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha; 21 dni), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2 kg/ha; 21 dni), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha; 21 dni).

Proti *oidiju vinske trte* pridejo v poštev: **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha; do začetka barvanja), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha; 35 dni karence), **DYNALI** (0,65 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha; do začetka zorenja), **CUSTODIA** (0,7 l/ha; do začetka zorenja), **SERCADIS** (0,15 l/ha; do barvanja jagod), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **MAMITA 250 EC** (0,2 l/ha; do mehčanja jagod), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha; do začetka zorenja), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha; do začetka zorenja), **POSTALON 90 SC** (1,25 l/ha; 28 dni karence), **TALENDO EXTRA** (0,13 - 0,3 l/ha; 30 dni), **TALENDO** (0,25 l/ha; 28 dni), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha; do začetka zorenja), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha; do začetka zorenja),...

V primeru neurja s točo opravite varstvo vinograda čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC** (28 dni), **FOLPAN 80 WDG** (35 dni), **FOLLOW 80 WG** (28 dni).

V primeru rabe sredstev, ki so čebelarjem nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 31.07.2019 11:47

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

