

27. VARSTVO VINSKE TRTE - 23.04.2020 23:07 - Zaključeno



Na območju vinorodne dežele Posavje vinska trta po pozebi stopa k regeneraciji in poskuša s preostalimi poganjki nadaljevati razvoj. Obstoječe mladike razvijajo tretji list (12 – 13 po lestvici BBCH).

Za zaščito mladik, katere med pozebo niso bile prizadete, je potrebno v naslednjih dneh proti **črni pegavosti vinske trte**, še pred dežjem, opraviti nanos: **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha) ali **POLYRAM DF** (3 kg/ha).

Z dodajanjem žveplovih pripravkov (pri temperaturah nad 15° C) boste zavirali predvsem razvoj pršic, ki povzročajo **akarinozo** in **erinozo**. V ta namen uporabite **THIOVT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG** ali **VINDEX 80 WG**.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 23.04.2020 23:07

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

