

28. VARSTVO VINSKE TRTE - 29.04.2020 14:35 - Zaključeno



Na območju vinorodne dežele Posavje vinski trti v pozehi nepoškodovane mladike dosegajo dolžino 10 do 12 cm. Padavine bodo pospešile njihovo razvijanje, ravno tako je po dežju pričakovano hitrejše regeneriranje trsov po pozehi in odganjanje sekundarnih brstov.

Vinogradnikom svetujemo, da kljub poškodbam v vinogradu in izpadu pridelka, skrbite za varstvo pred glivičnimi obolenji.

Pred **črno pegavostjo vinske trte**, poskrbite za zaščito s **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha) ali **POLYRAM DF** (3 kg/ha).

Z dodajanjem žveplovih pripravkov (pri temperaturah nad 15° C) boste zavirali predvsem razvoj pršic, ki povzročajo **akarinozo** in **erinozo**. V ta namen uporabite **THIOVIT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG** ali **VINDEX 80 WG**.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 29.04.2020 14:35

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

