

### 37. OBVESTILO ZA VARSTVO VRTNIN PRED LISTNIMI UŠMI - 07.05.2020 14:21 - Zaključeno



Ugodne temperature ter povečana vlaga vplivajo na razvoj **listnih uši**. V primeru prerasnjoitve, zaščito opravite z enim od navedenim pripravkov:

#### **MOSPILAN 20 SG**

0,25 kg/ha (2,5 g/100 m<sup>2</sup>) v papriki, paradižniku, jajčevcih, solati, kumarah, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino  
0,125 – 0,15 kg/ha (1,25 – 1,5 g/100 m<sup>2</sup>) v bučah in drugih bučnicah z neužitno lupino

#### **PIRIMOR 50 WG:**

- 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m<sup>2</sup>) v paradižniku, papriki, jajčevcih, bučah, bučkah, kumarah, dinjah in lubenicah v zaščiteneh prostorih, fižolu, grahu, korenju, peteršilju
- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m<sup>2</sup>) v solati na prostem in v zaščiteneh prostorih
- 0,42 kg/ha (4,2 g na 100 m<sup>2</sup>) v brstičnem ohrovtu in glavnatem zelju

#### **KARATE ZEON 5 CS**

- 0,15 l na ha (1,5 ml na 10 l/100 m<sup>2</sup>), v poru, zeleni, grahu, stročjem fižolu, papriki, paradižniku, jajčevcih, špinači, kumarah

#### **BIOTIP FLORAL**

- 20 ml/10 l vode na 125 m<sup>2</sup> v paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščiteneh prostorih
- 20 ml/10 l vode na 125 m<sup>2</sup> v papriki in kumarah v zaščiteneh prostorih
- 27 ml/10 l vode na 167 m<sup>2</sup> v solati na prostem
- 20 ml/10 l vode na 167 m<sup>2</sup> v solati v zaščiteneh prostorih

#### **CALYPSO SC 480**

- v 0,03 % koncentraciji (3 ml/10 l vode), v paradižniku, jajčevcih in papriki
- v 0,02 % koncentraciji (2 ml/10 l vode), v kumarah, dinjah in lubenicah

#### **CLOSER**

- 200 ml/ha (2 ml/100 m<sup>2</sup>), pri porabi 200 do 1500 l vode na ha v jajčevcih, bučkah, kumarah, kumaricah, dinjah, papriki, čiliju, bučah, paradižniku in lubenicah v zaščiteneh prostorih (rastlinjakih)
- 200 ml/ha (2 ml/100 m<sup>2</sup>), pri porabi 200 do 1000 l v brokoliju, brstičnem ohrovtu, zelju, kitajskem zelju, solati in špinači na prostem

#### **NATURALIS**

- 200 - 600 l/ha, v solati, endiviji in radiču na prostem in v zaščiteneh prostorih

#### **NEEMAZAL - T/S**

- 3,0 l/ha in porabi 500 do 800 l vode na ha v zelju, ohrovtu, brstičnem ohrovtu špinači in njej sorodnih vrstah, na prostem
- 2,5 l/ha in porabi 800 l vode v na bučnicah z užitno in neužitno lupino, paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščiteneh prostorih, ter na papriki v zaščiteneh prostorih

#### **BULLDOCK**

- 0,3 - 0,5 l/ha (3 - 5 ml na 100 m<sup>2</sup>) na glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovtu

#### **TEPEKI**

- 0,1 kg/ha pri porabi vode 400 do 1000 l/ha v kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah na prostem in v zaščiteneh prostorih.

*Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.*

Datum objave obvestila: 07.05.2020 14:21

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

[Seznam registriranih FFS](#)