

40. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 13.05.2020 00:06 - Zaključeno



V nasadih, kjer pozeba ni zredčila pridelka, so plodovi breskev in nektarin v premeru 30 – 35 mm, na stopnji sekundarnega odpadanja plodičev (73 po lestvici BBCH).

Pridelovalce obveščamo o potrebni zaščiti pred **breskovo pepelovko**. V poštev pridejo pripravki na osnovi žvepla: v obliki prahu: **COSAN, KUMULUS DF, MIKROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVT JET, VINDEK 80 WG** v odmerku 6 kg /ha, oz. tekoči obliki: **POL-SULPHUR, SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO, BIOTIP SULFO 800 SC** v odmerku 6 l/ha), oziroma s sredstvi **SERCADIS** (0,15 l/ha) ali **MAVITA 250 EC** (0,45 l/ha).

Pripravki na osnovi žvepla učinkujejo tudi proti **breskovemu škr lupu**, pri katerem beležimo v trenutno deževnem obdobju ugodne pogoje za okužbo.

Spremljajte prerasnmnožitve **listnih uši** (med najbolj škodljivimi je **siva breskova uš**) in zmanjšajte njihovo številčnost s pripravki: **TEPPEKI** (0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l na višinski meter krošnje na ha), **CALYPSO 480 SC** (0,3 l/ha), **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % konc.) ali **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

V primeru rabe sredstev, ki so čebelarom nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 13.05.2020 00:06

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)