

57. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 09.06.2020 16:17 - Zaključeno



Breskve in nektarine nadaljujejo razvoj plodičev, ki so premera polovice končne velikosti (75 po lestvici BBCH).

V obdobju pogostejših padavin svetujemo varstvo pred **breskovo pepelovko** s pripravki na osnovi žvepla (v prahu: **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MIKROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **THIOVIT JET**, **VINDEX 80 WG** v odmerku 6 kg /ha, oz. tekoči obliki: **POL-SULPHUR 800 SC**, **SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO**, **BIOTIP SULFO 800 SC** v odmerku 6 l/ha), oz. s sredstvi **SERCADIS** (0,15 l/ha), **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha) ali **MAVITA 250 EC** (0,45 l/ha).

Prilagoditve pripravki na osnovi žvepla učinkujejo tudi proti **breskovemu škr lupu**.

Opozorjamo še na zaščito pred **breskovim zavijačem** in **breskovim moljem**, katerih poškodbe preprečite z uporabo **CORAGEN** (300 ml/ha je največji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju), **AFFIRM** (3-4 kg/ha), **DELEGATE 250 WG** (0,3 kg/ha), **STEWART** (340 g/ha),... oz. **LASER PLUS** (0,25 l/ha), **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha) ali **AGREE WG** (1 kg/ha), ki so primerni tudi za ekološko pridelavo.

Na zavijače delno učinkujeta še **CALYPSO 480 SC** (0,3 l/ha) in **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % konc.), ki ju je smiselno uporabiti zlasti v primeru prerasnožitve **listnih uši**, slednjega pa tudi proti **marmorirani smrdljivki** (0,5 kg/ha).

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 09.06.2020 16:17

Obvestilo prognoističnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

