

40. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI - 07.04.2017 15:07 - Zaključeno



Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije tik pred cvetenjem (55 – 59 po BBCH), na zgodnjih legah pa v polnem cvetenju (60 – 65 po BBCH).

Zatiranje bolezni

Trenutno suho vreme ni dopuščalo pojava glivičnih bolezni v oljni ogrščici. Z nastopom padavin pa lahko pričakujemo prve okužbe z **belo zrnato gnilobo**, **črno pegavostjo** ali z drugimi glivičnimi boleznimi. Za njihovo zatiranje, priporočamo, da uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **ACANTO PLUS** (1 L/ha), **BALTAZAR** (1,5 – 2 L/ha), **CARAMBA** (1,2 L/ha), **FOLICUR EW 250** (1 L/ha), **MIRADOR FORTE** (1,5 – 2 L/ha), **ORIOUS 25 EW** (1 L/ha), **ORTIVA** (1 L/ha), **PROPI 25 EC** (0,5 L/ha), **PROSARO** (1 L/ha), **SCORE** (0,5 L/ha) ali **TAZER 250 SC** (1 L/ha).

Navedeni pripravki niso strupeni za čebele, a zaradi morebitnega odvrčalnega učinka priporočamo, da nanos opravite v večernem času.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 07.04.2017 15:07

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

